

아르케 수능 모의고사

수학 영역

2027학년도 수능 대비

2회

A R K E

2027학년도 대학수학능력시험 문제지

수학 영역

홀수형

성명		수험 번호						—					
----	--	-------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하십시오.

내가 날고 싶다면 너의 바람이 되어주겠다.

- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호, 문형(홀수/짝수), 답을 정확히 표시하십시오.
- 단답형 답의 숫자에 ‘0’이 포함되면 그 ‘0’도 답란에 반드시 표시하십시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.
배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하십시오.

※ 공통과목 및 자신이 선택한 과목의 문제지를 확인하고, 답을 정확히 표시하십시오.

- 공통과목 1~8쪽
- 선택과목
 - 확률과 통계 9~12쪽
 - 미적분 13~16쪽
 - 기하 17~20쪽

※ 시험이 시작되기 전까지 표지를 넘기지 마시오.

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\frac{1}{\sqrt[3]{9}} \times 12^{\frac{2}{3}}$ 의 값은? [2점]

- ① $2^{\frac{1}{3}}$ ② $2^{\frac{2}{3}}$ ③ 2 ④ $2^{\frac{4}{3}}$ ⑤ $2^{\frac{5}{3}}$

2. 함수 $f(x)=2x^3+x+4$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$ 의 값은? [2점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

3. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\sin^2 \theta = \frac{4}{5}$ 일 때, $\cos(\pi-\theta)$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{10}$
④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

4. 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2+ax+2 & (x<2) \\ x+a & (x\geq 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [3점]

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

5. 함수 $f(x) = (2x-1)(x^2+3x+4)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은? [3점]

- ① 13 ② 15 ③ 17 ④ 19 ⑤ 21

6. 첫째항과 공비가 모두 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$\frac{a_4}{a_2} = a_1, \quad a_5 = 8$$

을 만족시킬 때, a_7 의 값은? [3점]

- ① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

7. 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = x^3 + 3x + \int_0^2 f(t) dt$$

일 때, $f(3)$ 의 값은? [3점]

- ① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

8. 두 양수 a, b 에 대하여

$$\log_2 \frac{b}{a} = 2, \quad \log_2 \sqrt{a} + \log_4 b = 3$$

일 때, $a+b$ 의 값은? [3점]

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

9. 시각 $t=0$ 일 때 점 A(6)에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 점 P의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = 3t^2 - 6t + 4$$

이다. 점 P의 가속도가 0일 때, 점 P의 위치는? [4점]

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

10. $\cos A > 0$ 인 삼각형 ABC에 대하여

$$\overline{BC} = 8, \quad \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 94$$

이고, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 5일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? [4점]

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

11. $f'(0)=2$ 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x(f'(2x)-1)}$$

의 값이 $a=0$ 일 때 존재하고 $a=2$ 일 때 존재하지 않는다.
 $f(4)$ 의 값은? [4점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 16

12. 첫째항과 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$(a_1 + a_3)(a_2 + a_4) = 2a_1(a_4 + a_6) = 12$$

을 만족시킬 때, a_8 의 값은? [4점]

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

13. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 자연수 n 에 대하여 $f(-n)f(n) < 0$ 이다.
 (나) $f(0) > 0, f(2) < 0$

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

- <보 기>—
 ㄱ. $0 < \alpha < 2$ 인 실수 α 에 대하여 $f(\alpha) = 0$ 인 α 의 값이 존재한다.
 ㄴ. $f(3) > 0$ 일 때, $f(-4) < 0$ 이다.
 ㄷ. 부등식 $f(m)f(m+2) < 0$ 을 만족시키는 모든 정수 m 의 값의 합은 -4 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$(2\sin x + a)(\cos x + a - 2b) \leq 0$$

이 성립할 때, 두 실수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 최솟값은? [4점]

- ① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{17}{4}$ ④ $\frac{21}{4}$ ⑤ $\frac{25}{4}$

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x (|2t|f(t) - |f(t)|)dt$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $g'(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이고,
그 값들의 합은 0이다.

(나) $x \geq 0$ 일 때, $f'(x) > 0$ 이다.

$f(0)=0$ 일 때, $f(2)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{25}{2}$ ② 13 ③ $\frac{27}{2}$ ④ 14 ⑤ $\frac{29}{2}$

단답형

16. 방정식 $\log_4(3x+4) = \log_2 x$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을
구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 가

$$f'(x) = x^3 + 2f(0)x, \quad f(2) = 9$$

를 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + b_k) = 15, \quad \sum_{k=1}^{10} (2a_k - b_k) = 45$$

를 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k - b_k)$ 의 값을 구하시오. [3점]


19. 두 상수 a , b 에 대하여 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 가 $x=2$ 에서 극솟값 5를 가질 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. [3점]

20. 상수 a ($a > 1$)에 대하여 곡선 $y = a^{x+2} - 1$ 가 x 축과 만나는 점을 A 라 하자. x 축 위의 점 B 에서 접하고 제1사분면 위의 점 P 를 중심으로 하는 반지름의 길이가 3인 원이 곡선 $y = a^{x+2} - 1$ 과 만나는 두 점 중 x 좌표가 작은 점을 C 라 하자. 두 점 B , C 를 지나는 직선의 기울기가 -1 일 때, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 AC 의 기울기는 직선 AP 의 기울기의 2배이다.

(나) $\overline{AP} = 3\sqrt{5}$

다음은 삼각형 ABC 의 넓이를 S 에 대하여 $S+a^3$ 의 값을 구하는 과정이다.



세 상수 α , β , γ 에 대하여 점 C 의 좌표를 (α, β) 라 하고, 점 B 의 좌표를 $(\gamma, 0)$ 이라 하자. (단, $\beta > 0$)
두 점 B , C 를 지나는 직선의 기울기가 -1 이므로

$$\frac{\beta}{\gamma - \alpha} = 1$$

이다. $\overline{AP} = 3\sqrt{5}$ 에서 $\gamma = \boxed{\text{(가)}}$ 이고,
직선 AC 의 기울기는 직선 PA 의 기울기의 2배에서
 $\alpha = \boxed{\text{(나)}}$ 임을 알 수 있다.

따라서 $S + a^3 = \boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 할 때,
 $p+q+r$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 함수 $f(x) = -x^3 + 3x + 3$ 와 -1 보다 큰 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[-1, t]$ 에서 방정식

$$\frac{f(t) - f(-1)}{t + 1} = f'(c)$$

를 만족시키는 실수 c 의 개수를 $g(t)$ 라 하자.

함수 $g(t)$ 가 $t=a$ 에서 불연속인 모든 a 의 합을 S 라 할 때, $10 \times S$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5, \quad a_1 + a_5 = 147$$

이고, 등식

$$a_n = \sqrt{a_{n-1}a_{n+1} + 1} \quad (n = 2, 3, 4)$$

가 성립할 때, $a_2 + a_4$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. ${}_2\text{H}_4+{}_2\Pi_4$ 의 값은? [2점]

- ① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

24. 두 사건 A, B 에 대하여

$P(A)=\frac{2}{3}, \quad P(A^c\cap B^c)=\frac{1}{4}, \quad P(A\cap B)=\frac{1}{6}$

일 때, $P(B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

25. 어느 회사에서 일하는 개발자의 일주일 근무 시간은 평균이 m 시간, 표준편차가 8 시간인 정규분포를 따른다고 한다.

이 회사에서 일하는 개발자 중에서 임의추출한 16 명의 일주일 근무 시간의 표본평균이 40 시간 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이 0.9772 일 때, m 의 값은? [3점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 36 ② 40 ③ 44 ④ 48 ⑤ 52

26. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? [3점]

(가) $a+b+c+d=10$

(나) $|a-b+c-d| \geq 3$

- ① 140 ② 150 ③ 160 ④ 170 ⑤ 180

27. 두 이산확률변수 X, Y 의 확률분포를 표로 나타내면 각각 다음과 같다.

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	a	b	c	d	1

Y	3	6	11	18	합계
$P(Y=y)$	a	b	c	d	1

$E(X)=3, V(X)=1$ 일 때, $E(Y)$ 의 값은? [3점]


- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

28. 공이 24개 이상 들어 있는 바구니와 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적힌 6개의 비어 있는 상자가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 a ($a=1, 2, 3, 4, 5, 6$)일 때,
숫자 a 가 적힌 상자에 공이 a 개 미만 들어 있으면 바구니에 있는 공 a 개를 숫자 a 가 적힌 상자에 넣고,
숫자 a 가 적힌 상자에 공이 a 개 이상 들어 있으면 바구니에 있는 공 $7-a$ 개를 숫자 a 가 적힌 상자에 넣는다.

이 시행을 4번 반복한 후 숫자 1, 2, 3이 적힌 상자에 들어 있는 공의 개수의 합이 숫자 4, 5, 6이 적힌 상자에 들어 있는 공의 개수의 합보다 작지 않을 확률은? [4점]

- ① $\frac{17}{48}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{19}{48}$ ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{7}{16}$



단답형

29. 주머니 A에 흰 공 2개, 검은 공 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 공 3개, 검은 공 2개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 [실행 1]과 [실행 2]를 순서대로 하려고 한다.

[실행 1] 한 개의 주사위를 던져
 3의 배수인 눈이 나오면 주머니 A에서 임의로
 3개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣고,
 3의 배수가 아닌 눈이 나오면 주머니 A에서
 임의로 2개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣는다.
 [실행 2] 주머니 B에서 임의로 4개의 공을 꺼내어
 주머니 A에 넣는다.

[실행 2]가 끝난 후 주머니 A에 들어 있는 흰 공의 개수가 2이하일 때, [실행 1]에서 주머니 B에 넣은 공 중 흰 공이 존재하지 않았을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
 (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 세 문자 a, b, c 에서 중복을 허락하여 모두 6개를 선택하여 일렬로 나열할 때, a, b, c 중 두 번 이상 연속하여 나타나는 문자가 2개인 경우의 수를 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(5x+1)}{\sin x}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. 매개변수 t 로 나타내어진 곡선

$x = t \cos(\pi t), \quad y = t \sin(\pi t)$

에서 $t = \frac{1}{2}$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{2}{\pi}$ ② $-\frac{1}{\pi}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{\pi}$ ⑤ $\frac{2}{\pi}$

25. 수열 $\{a_n\}$ 이

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 4^n}{2^{n+1} + 4^{n+1}} = 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 4^n}{a_n + a_{n+1}}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

26. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여
함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. $g(1)=0$ 이고,
1보다 큰 모든 양의 실수 a 에 대하여

$$\int_1^a \frac{g(x)}{f'(g(x))} dx = a^3 + a \ln a - a$$

을 만족시킬 때, $(g(2))^2$ 의 값은? [3점]

- ① $8+2\ln 2$ ② $10+2\ln 2$ ③ $12+4\ln 2$
④ $14+4\ln 2$ ⑤ $16+4\ln 2$

27. 실수 전체의 집합에서 증가하는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x)=f\left(e^{|x|}+|x|\right)$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(0, g(0))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=2$ 일 때, $f(3)$ 의 값은? [3점]

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

28. 실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$g(x) \geq 0 \text{ 일 때, } f\left(e^{g(x)}\right)=6x+g(x) \text{ 이다.}$$

$$f(1)=1, \int_{\frac{1}{6}}^1 g(x) d x+g(1)=\int_0^1 f\left(e^x\right) d x \text{ 일 때,}$$

$$\int_0^{\frac{1}{6}} f\left(e^{6 x}\right) d x \text{의 값은? [4점]}$$

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{25}{84}$ ③ $\frac{29}{84}$ ④ $\frac{11}{28}$ ⑤ $\frac{37}{84}$

단답형

29. 모든 항이 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과
모든 항이 양수인 등비수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ a_1 = b_3, \ a_4 = b_1$$

$$(나) \ \sum_{n=1}^{\infty} (b_n \cos(\pi a_{2n})) = 8$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n = \frac{q}{p} \text{ 일 때, } p+q \text{의 값을 구하시오.}$$

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 상수 a 와 함수 $f(x) = e^x - 2e^{ax} - 2x + 1$ 에 대하여
함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = e^{2f(x)} - 2e^{f(x)}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 극대 또는 극소가 되는
모든 실수 α 의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열하면
 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ($\alpha_1 < 0$)이고, $f'(\alpha_3) < f'(\alpha_1)$ 일 때,

$$f''(0) = \frac{q}{p} \text{ 일 때, } p+q \text{의 값을 구하시오.}$$

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형


23. 포물선 $y^2 = 16x$ 의 초점의 x 좌표는? [2점]
- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

24. 좌표평면에서 두 직선
- $$\frac{x-2}{3} = y-3, \quad \frac{x+2}{6} = \frac{y+3}{a}$$
- 가 서로 평행할 때, 상수 a 의 값은? (단, $a \neq 0$) [3점]
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

25. 좌표공간 위의 점 $A(3, -3, 4)$ 를 xz 평면에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 A를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 선분 BC의 길이는? [3점]

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

26. 그림과 같이 모든 모서리의 길이가 같은 정사각뿔 $A-BCDE$ 가 있다. 선분 BE 위의 점 P에 대하여 평면 ACD와 평면 APD가 서로 수직일 때, $\frac{\overline{BP}}{\overline{EP}}$ 의 값은? [3점]



- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

27. 좌표평면에서 두 점 $F'(-2\sqrt{5}, 0)$, $F(2\sqrt{5}, 0)$ 을 초점으로 하는 타원 C 가 있다. 타원 C 위의 점 P 가

$$\overline{PF} = 2\overline{PF'}, \quad \angle FPF' = \frac{\pi}{2}$$

를 만족시킬 때, 직선 $x=3$ 이 타원 C 와 만나는 두 점 중 y 좌표가 작은 점을 A , 큰 점을 B 라 하자.
 선분 AB 의 길이는? [3점]

- ① $3\sqrt{3}$
 ② $\frac{13\sqrt{3}}{4}$
 ③ $\frac{7\sqrt{3}}{2}$
 ④ $\frac{15\sqrt{3}}{4}$
 ⑤ $4\sqrt{3}$

28. 점 O 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 4인 원 Γ 를 움직이는 점 P 와 길이가 2인 선분 OA 에 대하여 점 Q 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\overrightarrow{AP} \cdot (2\overrightarrow{AQ} - \overrightarrow{AP}) = 0$
 (나) $\overrightarrow{OQ} = k\overrightarrow{OP}$ (단, k 는 실수)

삼각형 OAQ 의 넓이의 최댓값은? [4점]

- ① $\sqrt{3}$
 ② 2
 ③ $\sqrt{5}$
 ④ $\sqrt{6}$
 ⑤ $\sqrt{7}$

단답형

29. 두 양수 a, b 에 대하여 두 곡선


$$C_1 : y^2 = 8x, \quad C_2 : (y-b)^2 = 8(a-x)$$

에 동시에 접하는 직선을 l_1, l_2 라 하자. 두 직선 l_1, l_2 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가) l_1 과 l_2 의 기울기의 차는 3이다.

(나) l_1 과 l_2 의 y 절편의 차는 $\frac{3}{2}$ 이다.

30. 좌표공간 위에 한 모서리의 길이가 6인 정사면체 ABCD가 있다. 네 선분 AB, CB, CD, DB를 각각 2:1로 내분하는 서로 다른 네 점 P, Q, R, S를 모두 지나는 구의 중심을 O라 할 때, 삼각형 ACD의 평면 OQS 위로의 정사영의 넓이를 k 라 하자. k^2 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.) [4점]



* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

※시험이 시작되기 전까지 표지를 넘기지 마시오.